

## Alterações do comportamento no idoso

A Sra. D<sup>a</sup> I.R., de 78 anos, vem à consulta acompanhada do filho, referindo alteração recente e flutuante do comportamento, com períodos de confusão mental e apatia e dificuldade em executar as tarefas da vida diária.

Há quatro meses tem quedas frequentes que associa às mudanças bruscas de posição.

A doente está lúcida e orientada no espaço, com alguma dificuldade em localizar factos recentes no tempo.

Tem equimoses extensas de cor acastanhada na zona central da face (aparentando duas a três semanas de evolução). *Facies* pouco expressivo, com diminuição da mímica facial e apatia. Não se observam assimetrias da face, desvio da comissura labial, disartria, alterações da marcha ou outros sinais de *deficit focal*.

Restante exame objectivo normal

Nos seus antecedentes pessoais destacam-se:

- Depressão
- Neoplasia da mama há quatro anos (mastectomizada)
- Insuficiência coronária
- Osteoartrose com limitação da mobilidade

Estas imagens são da TAC crâneo-encefálica realizada a pedido do seu médico de família.

### Pergunta 1

De que entidade clínica se trata?

- n Metástases cerebrais de neo da mama
- n Doença de Alzheimer
- n Hematoma subdural crónico
- n Acidente vascular cerebral

### Pergunta 2

Quais os sintomas referidos na história da doente que são típicos desta entidade ?

### Pergunta 3

Qual das situações referidas nos seus antecedentes pessoais teria maior probabilidade de causar um quadro clínico semelhante?

### Pergunta 4

Qual a terapêutica indicada e qual o prognóstico esperado?

### Respostas na página 80

Caso clínico enviado por Ana Ferrão

Chefe de Serviço de Medicina Geral e Familiar

